



DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION
ସଂପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ
Odisha University of Agriculture & Technology
Bhubaneswar-751003

ଧାନ ଫସଲରେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ବା ଚକଡ଼ା ପୋକର ପରିଚାଳନା

ତା ୧୭.୧୦.୨୦୨୩

ଝରିଫ ଧାନରେ ସାଧାରଣତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏହି ପୋକ ଦେଖାଯାଏ । ତାପମାତ୍ରା ୨୮-୩୦ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ତଥା ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଲେ ଏହି ପୋକ ଅଧିକ ଲାଗେ । ଅଧିକ ପବନ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିଲରୁ ଅନ୍ୟ ବିଲକୁ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ସହଜରେ ଯାଇପାରେ ।

ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ

ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟଗୁଡ଼ିକ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଛୋଟ ଓ ଲାମ୍ବା ଡେଶିଆ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । କୀଟର ଅର୍ଦ୍ଧକଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମାଟିଆ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧକ କୀଟଗୁଡ଼ିକ ଧାନବୁଦାର ମୂଳ ଭାଗରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହୋଇ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।



କ୍ଷତିର ଲକ୍ଷଣ

ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧକ କୀଟଗୁଡ଼ିକ ଧାନ ଗଛରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଆନ୍ତି ଓ ବିଶେଷ ଗତିଶୀଳ ନୁହଁନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଧାନ କିଆରୀରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ଏହି ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହି ପୋକଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧାନ ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ ।

ଗଛ ଉପରେ ଏହି ପୋକଗୁଡ଼ିକ ମଧୁ ଶିଶିର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଓ ଧାନ ଗଛ ମୂଳରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ଫଳରେ ଗଛ ଶୁଖି ମରିଯାଏ । କିଆରୀରେ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ହୋଇ ଧାନ ଗଛ ମରିଯାଏ । ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଆ ଜ୍ୱଳନ (Hopper burn) କୁହାଯାଏ । କ୍ରମେ ଧାନ କିଆରୀର ମଧ୍ୟ ଅଂଶରୁ ଏହା ହିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଥାସେ ଓ ଦୂରରୁ ସମୁଦାୟ କିଆରୀଟି ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ।



କ'ଣ କରିବେ

- ୧) ସୁବିଧା ଥିଲେ କିଆରୀରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ ଓ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୁନର୍ବାର ପାଣି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ୨) ପ୍ରତି ୬ ଫୁଟ ଅନ୍ତରରେ କନ୍ଦି/ପାହି ତିଆରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦା ମୂଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସହଜ ହେବା ସହିତ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ।
- ୩) ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମୋଦିତ ମାତ୍ରାରେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ୪) ଏକର ପ୍ରତି ହସ୍ତ ଚାଳିତ ସ୍ତେୟର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ୨୦୦ ଲିଟର କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବଣ ଓ ଶକ୍ତିଚାଳିତ ସ୍ତେୟର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ୬୦-୭୦ ଲିଟର କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବଣ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

୪) ସିଂଚନ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୋୟର୍ ନୋଜୋଲକୁ ବୁଦା ମୂଳକୁ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ପୋକଗୁଡ଼ିକ କୀଟନାଶକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ।

୬) ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ କୀଟନାଶକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

୭) କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ସତର୍କତା ବିଧି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।

କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ

୧) ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

୨) ଗୋଟିଏ କୀଟନାଶକକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

୩) ସିଲେଟିକ୍ ପାଇରିଥ୍ରାଏଡ (ସାଇପରମେଥ୍ରୀନ, ଡେଲ୍ମାମେଥ୍ରୀନ), କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ, କ୍ଲିନାଲଫସ, ମିଥାଇଲ୍ ପାରାଥ୍ରାଏନ୍ ଆଦି କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ବଂଶ ପୁନଃରୁଥାନରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଶତ୍ରୁକୀଟକର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଏ ।

୪) ଧାନ ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

୫) ଏକାଧିକ କୀଟନାଶକକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

୬) ବିନା ଅନୁମୋଦିତ କୀଟନାଶକ କୌଣସିମତେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

❖ ଉଚ୍ଚପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଏହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାପାଇଁ ଗଛର ମୂଳ ଭାଗରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କୀଟନାଶକ ଅନୁମୋଦିତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ

କ୍ର.ସଂ.	କୀଟନାଶକ ନାମ	ଏକର ପ୍ରତି ପରିମାଣ
୧.	ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି.	୬୦ଗ୍ରାମ
୨.	ପାଇମେଗ୍ରୋଜିନ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି.	୧୨୦ଗ୍ରାମ
୩.	ଡାଇନୋଟିଫୁରନ ୨୦% ଏସ.ଜି.	୮୦ଗ୍ରାମ
୪.	ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୧୭.୮% ଏସ.ଏଲ.	୬୦ ମି.ଲି.
୫.।	ଗ୍ରାଇଫ୍ଲୁମେଜୋପାଇରିନ ୧୦% ଏସ.ସି.	୧୦୦ ମି.ଲି.
୬.	ଏଥ୍ରପ୍ରୋଲ ୪୦+ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୪୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି.	୬୦ଗ୍ରାମ
୭.	ବୁପ୍ରୋଫେଜିନ ୨୨%+ ଫିପ୍ରୋନାଲ ୩% ଏସ.ସି.	୨୦୦ ମି.ଲି.
୮.	ଫିପ୍ରୋନାଲ ୦.୦୪%+ଥାଇୟୋମେଥୋସ୍ଫାମ ୪% ଏସ.ସି.	୪୪୦ ମି.ଲି.
୯.	ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୦.୦୬%+ ଲମ୍ବଡା ସାଇହାଲୋଥ୍ରୀନ ୦.୦୪% ଏସ.ସି.	୩୦୦ ମି.ଲି.

ବି.ଦ୍ର. ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର/ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର/ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଆମକୃଷି ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର ୧୫୫୩୩୩ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।



କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା

