

କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ (Downy mildew) ର ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା :-

କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା :- କଲରା, କାକୁଡ଼ି, କଖାରୁ ଓ ଜହ୍ନି ଆଦି ଫସଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନିମ୍ନମୁଖୀ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଏକ କବକ ବା ଫଫି ଜନିତ ରୋଗ । ଏହି ରୋଗଦ୍ୱାରା ଗଛ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଚିଲା ପଡ଼ି ଝଡ଼ିପଡ଼େ । ତଳ ଭାଗରେ ଛୋଟ ପାଣି ପତା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ପାଚିଲା ପତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷକଲେ ପତ୍ର ଉପରେ ଠିକିରି ପରି ତିନି କୋଣିଆ ବା ବହୁକୋଣିୟ ହଳଦୀଆ ଚିହ୍ନମାନ ଦେଖାଯାଏ ।

ଏହିରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ ୨ ଗ୍ରାମ ଭିଟାଭାକୁ ପାଞ୍ଚାର (କାର୍ବୋକ୍ଲିନ ୩୭.୫% + ଥିରାମ ୩୭.୫%) କିମ୍ବା ୬ ଗ୍ରାମ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ୍ ଫଫି ନାଶକ ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

ଫସଲରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି ମେଟିରାମ୍ ୫୫% + ପାଇରାକ୍ଲୋଥୋବିନ୍ ୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି. ୪୦୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଆଜୋକ୍ୱିଥୋବିନ୍ ୪.୮% + କ୍ଲୋରାଥାଲୋନିଲ ୪୦% ଏସ୍.ସି. ୬୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ସାଇମୋକ୍ୱାନିଲ୍ ୮% + ମାକୋଜେବ ୬୪% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ୪୦୦-୬୦୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଆଜୋକ୍ୱିଥୋବିନ୍ ୧୧% + ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୧୮.୩% ଏସ୍.ସି. ୩୦୦ ମି.ଲି. ଫଫି ନାଶକକୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ନୟାଗଡ଼
KRISHI VIGYAN KENDRA, NAYAGARH

ODISHA UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY, BHUBANESWAR
AT-PANIPOILA, PO-BALUGAON, DIST-NAYAGARH, PIN- 752070

